

## SCARLATTINA

**PERIODO DI INCUBAZIONE:** Il periodo di incubazione va da 2 a 5 giorni.

**PERIODO DI CONTAGIOSITA':** Il periodo di contagiosità va da 10 a 21 giorni a partire dalla comparsa dell'esantema nei casi non trattati e complicati mentre è di 48 ore dall'inizio di un adeguato trattamento antibiotico.

**MODALITA' DI TRASMISSIONE:** La trasmissione avviene attraverso grandi goccioline di secrezioni nasali o faringee (diametro superiore a 5 micron) o attraverso contatto diretto o intimo con il malato.

### PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEL MALATO

**ISOLAMENTO:** E' indicato l'isolamento domiciliare per 48 ore dall'inizio di un trattamento antibiotico efficace. In caso di ricovero ospedaliero devono essere osservate le precauzioni standard e per goccioline per 48 ore dall'inizio di un trattamento antibiotico efficace.

**MODALITA' DI RIAMMISSIONE:** Certificazione di riammissione del medico curante.

**PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEI PORTATORI:** Poiché è poco probabile la trasmissione da parte di un portatore, non è indispensabile il trattamento del portatore a meno che non si tratti di un familiare o di un contatto stretto di un soggetto affetto da malattia reumatica o nefrite o ripetute infezioni da Streptococco di gruppo A.

### PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEI CONVIVENTI E CONTATTI

**SORVEGLIANZA DELLA PERSONA:** La sorveglianza di conviventi e contatti stretti (inclusi i compagni di classe e gli insegnanti) deve essere effettuata per 7 giorni dall'ultimo contatto con il caso.

**PROFILASSI ATTIVA E PASSIVA:** Non si effettua alcun tipo di profilassi.